

ПАМЯТКА ПО ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ COVID-19.

Не зависимо от наименования вакцины, с использованием которой Вам предлагают сделать профилактическую прививку против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), необходимо знать:

Вам необходимо **отложить проведение вакцинации**, если в настоящее время у Вас:

- острое инфекционное или неинфекционное заболевание
- обострение хронического заболевания

Вы можете сделать прививку через 2-3 недели после выздоровления или начала ремиссии. При нетяжелых ОРВИ или кишечной инфекции допустимо проведение вакцинации после нормализации температуры тела!

Если Вы заболели острой инфекцией в период между первым и вторым введением вакцины, вторую дозу вакцины следует ввести сразу после выздоровления или с соблюдением интервала 21 день!

- был контакт с больным COVID-19 (или с лицом, у которого подозревают COVID-19)

Вы можете сделать прививку через 10-14 дней с момента контакта!

Вам **нельзя делать вакцинацию**, если:

- у Вас установлена гиперчувствительность на компоненты вакцины или вакцины, содержащие аналогичные компоненты
- у Вас ранее отмечались поствакцинальные серьезные побочные (нежелательные) реакции аллергического (анафилактического) характера;
- Вы беременны или кормите грудью
- Вы младше 18 лет (*уточнять для конкретной вакцины!*)

Вам **нельзя вводить вторую дозу вакцины**, если:

- у Вас после введения первой дозы вакцины возникла серьезная побочная (нежелательная) реакция (например, повышение температуры тела выше 40°C и др.), что может быть крайне редко.

ВАЖНО!

- Сообщите врачу о любых жалобах на состояние здоровья. После проведения медицинского осмотра врач даст разрешение на вакцинацию или предложит отложить проведение вакцинации.

- В течение 30 минут после проведения прививки не покидайте учреждение здравоохранения (место, где Вам делали прививку). Это позволит своевременно оказать квалифицированную медицинскую помощь в случае возможных аллергических реакций.

- После проведения вакцинации в первые – вторые сутки могут развиваться кратковременные общие (гриппоподобный синдром – озноб,

повышение температуры тела, боли в суставах и мышцах, слабость, общее недомогание, головная боль) и местные (болезненность, покраснение и отек в месте введения вакцины) реакции, которые разрешаются в течение последующих трех суток после возникновения.

Редко после вакцинации отмечаются тошнота, диспепсия, снижение аппетита, увеличение регионарных лимфатических узлов.

ВАЖНО!

- В течение трех суток после вакцинации:
не мочите место инъекции,
не посещайте баню (сауну),
избегайте чрезмерных физических нагрузок,
избегайте всего, что может неблагоприятно влиять на иммунную систему (прием алкоголя, курение и другое).
- Если у Вас развилась местная реакция, может принять антигистаминные средства.
- Если у Вас повысилась температура выше 38°C, можете принять нестероидное противовоспалительное средство.

ВАЖНО!

ПРОВЕДЕНИЕ ПРИВИВКИ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НЕ ОТМЕНЯЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ И СОБЛЮДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ДИСТАНЦИИ!

ГУ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ, ЭПИДЕМИОЛОГИИ И
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ»

www.rcheph.by
+375(29) 156-85-65